



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 12

JUNIE 2017

WISKUNDE V2

PUNTE: **150**

TYD: **3 uur**



* J M A T H A 2 *

Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye, insluitend 1 bladsy inligtingsblad, en 'n SPESIALE ANTWOORDEBOEK.

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit 11 vrae.
2. Antwoord AL die vrae in die SPESIALE ANTWOORDEBOEK voorsien.
3. Toon duidelik ALLE berekening, diagramme, grafieke, ensovoorts wat jy gebruik het in die bepaling van jou antwoorde.
4. Antwoorde alleen sal NIE noodwendig volpunte toegeken word NIE.
5. Indien nodig moet jy jou antwoorde tot TWEE desimale plekke afrond, tensy anders vermeld.
6. Diagramme is nie noodwendig volgens skaal getekend nie.
7. Jy mag 'n goedgekeurde wetenskaplike sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders vermeld.
8. 'n Inligtingsblad met formules is aan die einde van die vraestel ingesluit.
9. Skryf netjies en leesbaar.

VRAAG 1

Die persentasies wat deur leerlinge in hulle eerste Wiskunde-toets behaal is, word in die tabel hieronder getoon.

Persentasies	Frekwensie	Kumulatiewe Frekwensie
$30 \leq x < 40$	1	
$40 \leq x < 50$	2	
$50 \leq x < 60$	9	
$60 \leq x < 70$	12	
$70 \leq x < 80$	11	
$80 \leq x < 90$	9	
$90 \leq x < 100$	6	

- 1.1 Voltooi die kumulatiewe frekwensie kolom in die tabel wat in die ANTWOORDEBOEK gegee is. (3)
- 1.2 Teken 'n ogief (kumulatiewe frekwensie kurwe), op die rooster wat in die ANTWOORDEBOEK voorsien is, om die data voor te stel. (4)
- 1.3 Beraam hoeveel leerlinge 75% of minder in die toets behaal het. Toon dit met 'n B op die grafiek aan. (2)
[9]

VRAAG 2


Die water verbruik (in kiloliter) van 15 huisgesinne is soos volg:

12,4	20,0	34,5	40,1	18,9
19,7	34,9	15,1	23,8	23,7
31,1	20,9	19,7	36,5	33,6

- 2.1 Skryf die vyfgetalopsomming vir die data neer. (4)
- 2.2 Teken 'n mond-en-snor diagram om die data voor te stel. (3)
- 2.3 Lewer kommentaar op die skeefheid van die data wat in VRAAG 2.2 voorgestel is. (1)
- 2.4 Bepaal die standaardafwyking van die data. (2)
- 2.5 Gebruik die standaardafwyking om op die verspreiding van die data kommentaar te lewer. (1)
[11]

VRAAG 3


In die diagram is $A(t ; 1)$, $B(6 ; 9)$ en $C(8 ; -1)$ punte in 'n Cartesiesevlak. M is die middelpunt van BC . P is 'n punt op AB . CP sny AM by $F(4 ; 3)$. R is die x -afsnit van lyn AC en S is die x -afsnit van lyn PC .



- 3.1 Bereken die koördinate van M . (2)
 - 3.2 Bepaal die vergelyking van die mediaan AM . (4)
 - 3.3 Bereken die waarde van t . (2)
 - 3.4 Bereken die gradiënt van PC . (2)
 - 3.5 Bepaal die grootte van β . (2)
 - 3.6 Bereken die grootte van $A\hat{C}P$. (4)
- [16]

VRAAG 4

Vierhoek ABED, met hoekpuntee A (0 ; 2), B (7; 1), D (-1 ; -5) en E, is hieronder geskets. Hoeklyne AE en BD kruis by C.



- 4.1 Bereken die koördinate van C, die middelpunt van BD. (2)
 - 4.2 Toon dat CA = CB as die koördinate van C (3 ; -2) is. (3)
 - 4.3 Waarom is $D\hat{A}B = 90^\circ$? (5)
 - 4.4 Gee, vervolgens, die vergelyking van die sirkel met middelpunt C wat deur A, B, E en D gaan. (2)
 - 4.5 Bereken die gradiënt van BC, die radius van die sirkel. (2)
 - 4.6 Bepaal die vergelyking van die raaklyn aan die sirkel by B in die vorm $y = \dots$ (3)
 - 4.7 Verduidelik waarom ABED 'n reghoek is. (3)
- [20]

VRAAG 5

5.1 As $\sin 58^\circ = k$, bepaal, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar:

5.1.1 $\sin 238^\circ$ (2)

5.1.2 $\cos 58^\circ$ (2)

5.2 Vereenvoudig, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar:

$$\frac{\tan 150^\circ \cdot \sin 300^\circ \cdot \sin 10^\circ}{\cos 225^\circ \cdot \sin 135^\circ \cdot \cos 80^\circ} \quad (7)$$

5.3 Gegee $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$

Gebruik die formule vir $\cos(\alpha + \beta)$ om die formule vir $\sin(\alpha + \beta)$ af te lei. (4)

5.4 Bewys die identiteit: $\frac{\cos 2x + 1}{\sin 2x \cdot \tan x} = \frac{1}{\tan^2 x}$ (4)

5.5 5.5.1 Toon aan dat $\tan x = 2\sin x$ geskryf kan word as $\sin x = 0$ of $\cos x = \frac{1}{2}$. (3)

5.5.2 Skryf, vervolgens, die algemene oplossing van die vergelyking

$\tan x = 2 \sin x$ neer. (4)

[26]

VRAAG 6


Gegee $f(x) = \tan x$ en $g(x) = \sin(x + 45^\circ)$

- 6.1 Teken die grafieke van $f(x)$ en $g(x)$ op dieselfde assestelsel vir $x \in [-90^\circ; 180^\circ]$, op die rooster wat in die ANTWOORDEBOEK voorsien is. (6)
- 6.2 Gebruik jou grafieke om die waarde(s) van x , in die interval $x \in [-90^\circ; 90^\circ]$ te bepaal, waarvoor:
- 6.2.1 $g(x) - f(x) = 1$ (2)
- 6.2.2 $g(x) \geq f(x)$ (2)
- 6.3 Meld die periode van $y = f(2x)$. (1)
[11]

VRAAG 7

Om die hoogte h van 'n boom CD te bepaal was die einde van die skaduwee op twee verskillende tye van die dag by punte A en B, in dieselfde horisontalevlak as C, gemeet. Die skaduwee van die boom het z° tydens die observasie tye roeteer, d.w.s. $A\hat{C}B = z^\circ$.

$AB = d$ meter, $A\hat{B}C = k^\circ$ en die hoogtehoek van die son by A was y° .




- 7.1 Bepaal die lengte van AC in terme van z , k en d . (2)
- 7.2 Bepaal die lengte van AC in terme van y en h . (2)
- 7.3 Toon, vervolgens, dat $h = \frac{d \sin k \cdot \tan y}{\sin z}$. (1)
- 7.4 Bereken die lengte van h as $z = 125^\circ$, $d = 80m$, $k = 38^\circ$ en $y = 40^\circ$. (2)
[7]

Gee redes vir ALLE bewerings in VRAAG 8, 9, 10 EN 11.

VRAAG 8


In die figuur is AB die middellyn van die sirkel met middelpunt O. AB is verleng na P. PC is 'n raaklyn aan die sirkel by C en lyn ODE is loodreg op BC en sny BC by D en PC by E.



- 8.1 Gee 'n rede waarom $CD = DB$ is. (1)
 - 8.2 Toon aan dat $AC \parallel OE$. (3)
 - 8.3 As $B\hat{C}P = x$, noem twee ander hoeke gelyk aan x . (4)
 - 8.4 Bewys dat $OBEC$ 'n koordevierhoek is. (2)
- [10]**

VRAAG 9

In die diagram is BD die middellyn van die sirkel ABCD met middelpunt O. $\widehat{ABD} = 26^\circ$ en $\widehat{BOC} = 98^\circ$.



Bereken:

9.1 \widehat{A} (2)

9.2 \widehat{B}_1 (3)


9.3 \widehat{C}_2 (3)
[8]

VRAAG 10

In die diagram hieronder is PQRS 'n parallelogram, met die hoeklyne wat by M sny.

$\hat{P}QR = 90^\circ$. QR is verleng na U. T is 'n punt op PS. TU sny QS by V.

$$PQ = 6, \quad PR = 8, \quad RU = 5 \text{ en } VS = \sqrt{13}$$



10.1 Bepaal, met redes, die volgende verhoudings in eenvoudige vorm:


$$10.1.1 \quad \frac{UR}{RQ} \quad (3)$$

$$10.1.2 \quad \frac{VM}{MQ} \quad (4)$$


10.2 Bewys, vervolgens, dat $MR \parallel VU$. (2)
[9]

VRAAG 11

11.1 In $\triangle ABC$ en $\triangle DEF$, is $\hat{A} = \hat{D}$, $\hat{B} = \hat{E}$ en $\hat{C} = \hat{F}$, onderskeidelik. Bewys dat $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$.



11.2 Raaklyne PQ en PR raak die sirkel by Q en R onderskeidelik. T is 'n punt op die sirkel sodat $QT = QR$. QT en PR word verleng en ontmoet PS by S . $\hat{Q}_1 = x$.



11.2.1 Noem DRIE ander hoeke gelyk aan x . (3)

11.2.2 Bepaal, in terme van x , die grootte van \hat{Q}_2 . (2)

11.2.3 Toon, vervolgens, aan dat $TR \parallel QP$. (3)

11.2.4 Bewys dat $\triangle STR \parallel\!\!\!\parallel \triangle SRQ$. (3)

11.2.5 Toon, vervolgens, aan dat $RS^2 = ST \times SQ$. (2)

11.2.6 Indien dit verder gegee is dat $QT : TS = 3 : 2$, toon dat $\frac{SP}{PQ} = \frac{5}{3}$. (3)

[23]

TOTAAL: 150

INLIGTINGSBLAD : WISKUNDE

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$A = P(1+ni)$$

$$A = P(1-ni)$$

$$A = P(1-i)^n$$

$$A = P(1+i)^n$$

$$\sum_{i=1}^n 1 = n$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$T_n = a + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$$

$$T_n = ar^{n-1}$$

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r-1}; \quad r \neq 1$$

$$S_\infty = \frac{a}{1-r}; \quad -1 < r < 1$$

$$F = \frac{x[(1+i)^n - 1]}{i}$$

$$P = \frac{x[1 - (1+i)^{-n}]}{i}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

$$y = mx + c$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \tan \theta$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$$\text{In } \Delta ABC: \quad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$\text{area } \Delta ABC = \frac{1}{2} ab \sin C$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos 2\alpha = \begin{cases} \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ 1 - 2\sin^2 \alpha \\ 2\cos^2 \alpha - 1 \end{cases}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ and } B)$$

$$\hat{y} = a + bx$$

$$b = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2}$$

