



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

**GRAAD 12**

**LANDBOUWETENSKAPPE V1**

**NOVEMBER 2018**

**NASIENRIGLYNE**

**TOTAAL: 150**

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 9 bladsye.

**AFDELING A****VRAAG 1:**

1.1	1.1.1	B ✓✓		
	1.1.2	B ✓✓		
	1.1.3	C ✓✓		
	1.1.4	B ✓✓		
	1.1.5	C ✓✓		
	1.1.6	D ✓✓		
	1.1.7	D ✓✓		
	1.1.8	A ✓✓		
	1.1.9	A ✓✓		
	1.1.10	D ✓✓	(10 x 2)	(20)
1.2	1.2.1	Slegs A ✓✓		
	1.2.2	Geeneen ✓✓		
	1.2.3	Slegs A ✓✓		
	1.2.4	Beide A en B ✓✓		
	1.2.5	Slegs B ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.3	1.3.1	Parakeratose ✓✓		
	1.3.2	Nippeldrinker/nippel ✓✓		
	1.3.3	Ejakulasie ✓✓		
	1.3.4	Meiose ✓✓		
	1.3.5	Spermatosoön/spermsel ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.4	1.4.1	Pearson ✓		
	1.4.2	Vryloop/agterplaas/semi intensief ✓		
	1.4.3	Aansteeklike/oordraagbare/patogenies ✓		
	1.4.4	Distokia/gekompliseerde ✓		
	1.4.5	Mesoderm ✓	(5 x 1)	(5)

**TOTAAL AFDELING A: 45**

**AFDELING B****VRAAG 2: DIEREVOEDING****2.1 Die interne dele van die spysverteringskanaal van herkouers****2.1.1 Identifikasie van deel**

- B Omasum ✓ (1)  
C Retikulum ✓ (1)

**2.1.2 Die funksie van DEEL B**

- Terughou van harde en onverteerde bestanddele/growwe en fyn voedselpartikels word geskei ✓
- Fynmaal van voedselbestanddele ✓
- Absorpsie van water ✓
- Groter partikels beweeg terug na die rumen ✓
- Absorbeer somige vlugtige vetsure (Enige 1) (1)

**2.1.3 Strukture in DEEL A verantwoordelik vir hitte produksie**

Hitte stafies/papille ✓ (1)

**2.1.4 EEN vereiste van rumen mikrobes in herkouers**

- Maklik verteerbare koolhidrate/reguleer voedselinname ✓
- Voldoende mineraal voedingstowwe ✓
- Voldoende stikstof ✓
- Anaerobiese/suurstof vrye toestande ✓
- Neutrale omgewing/gesikte pH/effe suur/pH 5,5 – 6,5 ✓
- Teenwoordigheid van koolstofdioksied/CO<sub>2</sub> ✓
- Temperatuur van 38 - 42 °C/warm toestande ✓
- Voortdurende verwydering van afvalstowwe ✓
- Teenwoordigheid van vlugtige vetsure ✓
- Genoegsame/voldoende water/vogtige toestande ✓ (Enige 1) (1)

**2.2 Voedingsproef van herkouers****2.2.1 Die verteerbaarheidskoëffisiënt**

$$\frac{\text{Droë materiaal inname (kg)} - \text{Droë materiaal in mis (kg)}}{\text{Droë materiaal inname (kg)}} \times 100 \quad \checkmark$$

$$\text{DM} = \frac{10}{100} \times 12\text{kg} = 1,2\text{kg} \text{ (voginhoud)}$$

**OF**

$$\text{DM} = \frac{90}{100} \times 12\text{kg} = 10,8\text{kg} \text{ (droë materiaal)} \quad \checkmark$$

$$= \frac{(12\text{kg} - 1,2\text{kg})}{10,8\text{kg}} \times 100$$

**OF**

$$= \frac{10,8 - 1,2}{10,8} \times 100 \quad \checkmark$$


$$= 35,19/35,2 \quad \checkmark \quad \% \quad \checkmark$$

(5)

- 2.2.2 **Gevolg van die berekende verteerbaarheidskoëffisiënt**
- Meer (64,8%) van die voer was uitgeskei ✓
  - Minder (35,2%) van die voer was verteer en geabsorbeer ✓
  - Hoë ruvesel inhoud ✓
- (Enige 1) (1)
- 2.2.3 **Klassifikasie van voer**  
Ruvoer ✓ (1)
- 2.3 **Dierevoere**
- 2.3.1 **Voer geskik vir jong groeiende diere**  
Voer A ✓ (1)
- 2.3.2 **Rede vir die antwoord in VRAAG 2.3.1**
- Het 'n noue voedingsverhouding/VV van 1:3,4 ✓
  - Hoë proteïen inhoud/VP van 18% ✓
- (Enige 1) (1)
- 2.3.3 **VOER B kan nie aanbeveel word as hoofbron vir nie-herkouers**  
Dit het 'n hoë ruveselinhou/RV van 17% ✓ en 'n lae TVV/55% wat laer as 60% is ✓ (2)
- 2.3.4 **Verwantskap tussen die TVV en die RV in VOER A**  
Hoe laer die ruveselinhou ✓ hoe hoër die TVV ✓ (2)
- 2.4 **Energie waarde en die energie verlies (per kg)**
- 2.4.1 **Energieverlies in mis indien plaasdier 5kg voer benut**  
42,5J ✓ (1)
- 2.4.2 **Identifikasie van die gas met die hoogste energie verlies**  
Metaan ✓ (1)
- 2.4.3 **Berekening van die energie beskikbaar vir groei en produksie**  

$$\begin{aligned} NE &= BE - (\text{energie verliese in mis} + \text{in urine} + \text{as hitte} + \text{as metaan}) \\ &= 18,5J - 14 J/(8,5J + 1,2J + 1,8J + 2,5J) ✓ \\ NE &= 4,5 ✓ J ✓ \end{aligned}$$
 (3)
- 2.5 **Voervloeiprogram**
- 2.5.1 **Berekening van die tekort in September**
- $(66 - 55)$  ton ✓
  - = 11ton ✓
- (2)

### 2.5.2 Staafgrafiek van die totale hoeveelheid voer beskikbaar en benodig deur plaasdiere vir een jaar



### KRITERIA/RUBRIEK/NASIENRIGLYNE

- Korrekte opskrif ✓
  - X-as: Korrek gekalibreer met byskrif (Maande van die jaar) ✓
  - Y-as: Korrek gekalibreer met byskrif (Totale hoeveelheid voer beskikbaar en benodig) ✓
  - Korrekte eenheid (ton) ✓
  - Staafgrafiek ✓
  - Akkuraatheid ✓
- (6)

### 2.6 Maniere van voeraanvulling

- 2.6.1 Grondsooie ✓ (1)
  - 2.6.2 Ureum ✓ (1)
  - 2.6.3 Implantings ✓ (1)
  - 2.6.4 Waterbakke ✓ (1)
- [35]

## VRAAG 3: DIEREPRODUKSIE, BESKERMING EN BEHEER

### 3.1 Diereproduksiestelsels

- 3.1.1 Identifikasie van produksiestelsel
  - A Ekstensiewe produksiestelsel ✓ (1)
  - B Intensiewe produksiestelsel ✓ (1)

- 3.1.2 **Vergelyking van die twee stelsels t.o.v kapitaal besteding**  
**A** Minder kapitaal word geïnvesteer ✓ (1)  
**B** Meer kapitaal word geïnvesteer ✓ (1)
- 3.2 **Voerprogram vir braaikuikenproduksie**
- 3.2.1 **Vergelyking van die voedingsbehoeftes van braaikuikens in groeifase**  
**A** Braaikuikens benodig 'n hoë proteïenryke dieet ✓ (1)  
**B** Braaikuikens benodig 'n hoë energieryke dieet ✓ (1)
- 3.2.2 **Rede vir die voedingsbehoefte in groeifase A**  
Vir groei ✓ (1)
- 3.2.3 **TWEE ander faktore om produksie in braaikuikens te verhoog**  
  - Beheerde omgewing/gesikte behuising ✓
  - Teling ✓
  - Goeie gesondheids/higiëniese toestande ✓
  - Algemene bestuur van die onderneming ✓
  - Tegniese vaardighede/vaardige werkers ✓
(Enige 2) (2)
- 3.3 **Behuisingsfasilitete vir reproduserende varke**
- 3.3.1 **Identifikasie van die fasilitet**  
Jonghok/krat ✓ (1)
- 3.3.2 **Ontwerp kenmerke van die fasilitet vir klein varkies**  
Afskorting/struktuur tussen die sog en die kleintjies sodat sy op haar  
sy kan lê met die varkies appart/afskorting/struktuur tussen die sog en  
die klein varkies ✓ (1)
- 3.3.3 **Toerusting/materiaal in die fasilitet om temperatuur te reguleer**  
(a) Lugversorgers/verwarmers/infrarooi verhitters/ligte/verhitte  
vloere ✓ (1)  
(b) Beddegoed/materiaal ✓ (1)
- 3.4 **Plaasdierereproduktiwiteit**
- 3.4.1 **Die belangrikste toestand wat negatief op produksie inwerk**  
Ongunstige weerstoestande/oormatige warm/koue toestande ✓ (1)
- 3.4.2 **TWEE ekonomiese gevolge van die toestand vir die boer**  
  - Spandeer meer geld aan voer tydens koue weerstoestande ✓
  - Inkomste/produksie verliese a.g.v. onbeheerde toestande ✓
(2)
- 3.4.3 **Maatstawwe deur boere om die gevolge van veranderende  
temperature te verminder**  
(a) Voorsien skaduwee/afkoeling/voldoende water ✓ (1)  
(b) Voorsien beskutting/verskuif diere nader aan die huis ✓ (1)
- 3.5 **Hanteringsfasilitete in 'n intensiewe produksiestelsel**

3.5.1	<b>Identifikasie van die fasilititeit</b>		
A	Houkrale/opvangkrale/krale ✓	(1)	
C	Drukgang ✓	(1)	
3.5.2	<b>Hoofdoel van die nekklamp</b>		
	Beperk/beheer diere/sodat diere kan stilstaan ✓	(1)	
3.5.3	<b>TWEE ontwerpkenmerke van 'n drukgang</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moet sterk/stewig/duursaam wees ✓</li> <li>• Hoog/wyd genoeg vir die spesifieke tipe dier ✓</li> <li>• Geen skerp draaie nie ✓</li> <li>• Moet veilig vir diere/hanteerders wees ✓</li> <li>• Skoon ✓</li> </ul>	(Enige 2)	(2)
3.6	<b>Siektes in plaasdiere</b>		
	<b>Ontbrekende inligting</b>		
A	Hondsadolheid ✓	(1)	
B	Word deur geïnfekteerde dier gebyt/speeksel/liggaamsvloeistof ✓	(1)	
C	Bakterie ✓	(1)	
D	Rooiwater ✓	(1)	
E	Bloubosluisbyt ✓	(1)	
F	Haar verlies/skubagtige/jeukerige ringvormige letsels/korsagtige grys/wit rowe ✓	(1)	
3.7	<b>Lewenssiklus van 'n parasiet in plaasdiere</b>		
3.7.1	<b>Die parasiet</b>		
	Lintwurm ✓	(1)	
3.7.2	<b>Aanduiding van gashere</b>		
	Twee gashere ✓	(1)	
3.7.3	<b>TWEE ekonomiese implikasies van die parasiet vir die boer</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksie verliese ✓</li> <li>• Besmette karkasse word by die slagpale afgegradeer ✓</li> <li>• Verlies aan inkomste/wins ✓</li> <li>• Hoë kostes van behandeling ✓</li> </ul>	(Enige 2)	(2)
3.7.4	<b>TWEE rolle van die staat in die beheer van die verspreiding van interne parasiete</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vleis inspeksies/toetsing/higiëne ✓</li> <li>• Navorsing/uitryk na boere ✓</li> <li>• Wetgewing t.o.v. die pligte/rolle/verantwoordelikhede van die plaaseienaars ✓</li> <li>• Opskort van invoere ✓</li> </ul>	(Enige 2)	(2)
			[35]

**VRAAG 4: DIEREREPRODUKSIE****4.1 Die manlike reproduksiestelsel**

<b>4.1.1 Identifikasie van deel</b>		
A Vas deferens/ampulla ✓	(1)	
B Uretra ✓	(1)	
<b>4.1.2 TWEE funksies van die afskeiding van die vesikulêre klier</b>		
• Verskaf voeding/energie aan spermselle ✓		
• Vervoer van die spermselle ✓		
• Beskerm spermselle teen 'n verandering in pH/buffer ✓ (Enige 2)	(2)	
<b>4.1.3 Aangebore defekte in deel D</b>		
• Onderontwikkeling/hipoplasie ✓		
• Pennis te kort/te lank ✓		
• Abnormale openinge ✓		
• Kort retraktor penis spier ✓	(Enige 1)	(1)
<b>4.1.4 Die effek van vrugbaarheid op die bul indien deel E</b>		
(a) Affekteer spermatogenese/lae spermsel telling/denaturasie van die sperme/onvrugbaarheid ✓	(1)	
(b) Geen spermselle word geproduseer nie/bul is steriel ✓	(1)	
<b>4.2 Hormonale beheer tydens die estrussiklus</b>		
<b>4.2.1 Identifikasie van die hormoon</b>		
A Estrogeen ✓	(1)	
C Progesteroon ✓	(1)	
<b>4.2.2 Verduideliking van die proses in B</b>		
Vrystelling van ovum ✓ vanaf die volwasse Graafse follikel	(2)	
<b>4.2.3 TWEE sigbare tekens wat vertoon word wanneer estrus op sy piek is</b>		
• Spring op ander koeie ✓		
• Rusteloos ✓		
• Vulva is geswel ✓		
• Oormatige slym afskeiding vanuit die vulva ✓		
• Slymvliese/membrane van die vagina is rooi en vogtig ✓		
• Krapmerke/mis/modder agter op kruis van koeie ✓		
• Koeie laat dekking toe ✓		
• Die stert is opgelig ✓		
• Hare aan die kop van die stert en romp is opgepof ✓ (Enige 2)	(2)	
<b>4.2.4 Funksie van FSH</b>		
• Stimuleer die formasie van die follikels ✓		
• Fasiliteer/stimuleer groei/ontwikkeling/funksionering van die Graafse follikel ✓ (Enige 1)	(1)	
<b>4.3 Reproduksieprosesse in skape</b>		
<b>4.3.1 Korrekte chronologiese volgorde</b>		
C ✓	(1)	
A ✓	(1)	
D ✓	(1)	
E ✓	(1)	
B ✓	(1)	

**4.3.2 Definisie van sinchronisering van estrus**

Verander die estrussiklus in 'n groep ooie/vroulike diere ✓ sodat al die ooie/vroulike diere op ongeveer dieselfde tyd in estrus sal kom ✓

(2)

**4.4 Die reproduksiesiklus van melkkoeie****4.4.1 Die maand waarin kunsmatige inseminasie moet plaasvind**

Mei ✓

(1)

**4.4.2 TWEE moontlike oorsake waarom die koei nie dragtig is nie**

- Onbehoorlike hantering van semen/swak semen gehalte ✓
- Onbevoegde operator met geen ondervinding ✓
- Siektes/infeksies ✓
- Wanvoeding ✓
- Aangebore defekte/faktore ✓
- Tydsberekening is verkeerd ✓

(Enige 2)

(2)

**4.4.3 DRIE oorsake van aborsies in melkkoeie**

- Besmettings/infeksies/siektes ✓
- Wanvoeding ✓
- Beserings ✓
- Swak/slegte hantering van diere/stress ✓
- Omgewingsfaktore ✓
- Genetiese/aangebore faktore ✓
- Sterk lakseermiddels ✓
- Toksiese elemente in voer ✓
- Enting/immunisasie ✓
- Tweelinge ✓

(Enige 3)

(3)

**4.4.4 Die laaste reproduksie proses voor melkproduksie begin**

Kalwing/geboorte/parturisie ✓

(1)

**4.5 Die grafiek van melkproduksie, bottervet en ruveselinhou van melkkoeie vir 10 maande****4.5.1 Maand 6 ✓**

(1)

**4.5.2 45liter ✓**

(1)

**4.5.3 DRIE redes vir die afname in melkproduksie**

- Ongesteldheid/siektes ✓
- Wanvoeding/verkeerde voeding ✓
- Ongunstige weerstoestande ✓

(3)

**4.5.4 Verwantskap tussen ruvesel en bottervet vir maande 6 - 10**

Soos die ruveselinhou toeneem ✓ sal die bottervetinhoud ook toeneem ✓

(2)

[35]

**TOTAAL AFDELING B:****105****GROOTTOTAAL:****150**